

|                    |         |  |     |    |
|--------------------|---------|--|-----|----|
| *Eコ-ウイルス 1 型(NT)髄液 |         | 7064000  |     |    |
|                    |         | 担当部署   |     |    |
| L-Eコ-1NT           |         | 外注   |     |    |
| <b>検査オーダー</b>      |         |  |     |    |
| 患者同意に関する要求事項       |         | 特記事項なし   |     |    |
| オーダーリング手順          | 1       | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→Eコ-→  |     |    |
|                    | 2       |  |     |    |
|                    | 3       |  |     |    |
|                    | 4       |  |     |    |
|                    | 5       |  |     |    |
| 検査に影響する臨床情報        |         | 該当なし   |     |    |
| 検査受付時間             |         | 8 : 15 ~ 16 : 00   |     |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>  |         |  |     |    |
| 患者の事前準備事項          |         | 特記事項なし   |     |    |
| 検体採取の特別なタイミング      |         | 急性期（発病 2~7 日）と回復期（2~3 週）の検体を同時測定し、回復期の抗体価が急性期の結果の 4 倍（11 管差）以上に上昇したとき、血清学的に有意とみなします。 |     |    |
| 検体の種類              | 採取管名    | 内容物  | 採取量 | 単位 |
| 1 髄液               | 3 5 滅菌管 | なし   | 10  | mL |
| 2 -                | -       | -  | -   | -  |
| 3 -                | -       | -  | -   | -  |
| 4 -                | -       | -  | -   | -  |
| 5 -                | -       | -  | -   | -  |
| 6 -                | -       | -  | -   | -  |
| 7 -                | -       | -  | -   | -  |
| 8 -                | -       | -  | -   | -  |
| 検体搬送条件             |         | 室温   |     |    |
| 検体受入不可基準           |         | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物   |     |    |
| 保管検体の保存期間          |         | 検査委託先で 2 週間  |     |    |
| <b>検査結果・報告</b>     |         |  |     |    |

|          |   |      |      |      |      |   |
|----------|---|------|------|------|------|---|
| 検査室の所在地  | 株式会社 BML 総合研究所<br>350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |      |   |
| 測定時間     | 8～14日                                   |      |      |      |      |   |
| 生物学的基準範囲 | 設定根拠については外注検査室に問合せ                      |      |      |      |      |   |
| 臨床判断値    | 設定根拠については外注検査室に問合せ                      |      |      |      |      |   |
| 基準値      |   |      |      |      | 単位   | T |
| 共通低値     | 共通高値                                    | 男性低値 | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |   |
| 0        | 1                                       |      |      |      |      |   |
| パニック値    | 高値                                      | 該当なし |      |      |      |   |
|          | 低値                                      | 該当なし |      |      |      |   |
| 生理的変動要因  | 該当なし                                    |      |      |      |      |   |
| 臨床的意義    | 外注項目の為省略                                |      |      |      |      |   |